

ABECEDA KLINICKÉ HOMEOPATIE

CHELIDONIUM MAJUS (Vlaštovičník velký)

Klíčová slova, etiologické vztahy:

- > Játra, žlučník, žlučovody
- > Pravostrannost
- > Novorozenecká žloutenka
- > Bodavá bolest v oblasti pravého hypochondria
- > Nevolnost, hořká chuť v ústech, zvracení

Indikace

- > Ikterus způsobený cholestázou
- > Virová a toxická hepatitida s cholestázou
- > Žlučové koliky někdy s vystřelováním pod pravou lopatku
- > Hypercholesterolemická lithiáza
- > Zácpa se světlou stolicí
- > Astma zhoršené po 16. hodině s kašlem a pocitem prachu v krku
- > Pneumopatie pravé báze se subicterem
- > Pravostranné migrény

Modality

Zhoršené: mezi 16. a 20. hodinou, horkem, dotykem

Zlepšené: velmi horkými nápoji, tlakem do hloubky a šířky

Příklady z praxe:

1. kasuistika

Chelidonium je lék, který doporučuji velmi často a myslím si, že by měl být v každé domácí lékárnice. I když je v Materii medicae uvedeno, že je to lék na žlučnickové problémy, já osobně ho vnímám jako určitou analogii Pancreolanu. Ve své praxi ho podávám pacientům s trávicími potížemi, které jsou vázány na tučné nebo hůře stravitelné jídlo. Velmi dobře zabírá při pocitech plného žaludku, který zpomalně tráví nebo nedokáže zpracovat některé potraviny, jako například topinky s česnekem, což je typické pro „žlučnickáře“. Je dobré lék podat před jídlem i po jídle, eventuálně po jídle i opakovaně do vymizení obtíží. Dokonce i pacienti po cholecystektomii, u kterých přetrvávají trávicí potíže, se po nasazení Chelidonia normalizují. Lék také funguje u pacientů, kteří si stěžují na soustavnou nebo občasnou bolest v pravém podžebří způsobenou kameny ve žlučníku. Také v případech prodělané pankreatitidy má Chelidonium dobrý efekt. Velmi dobře dokáže lék ovlivnit i tzv. žlučnickové migrény.

Ještě bych ráda připomněla, že Chelidonium je lékem pro pacienty, kteří se snadno rozčílí, ale většinou to nedávají najevo. U dětí je Chelidonium obvykle lékem následujícím po Lycopodiu, které nemělo dostatečný efekt.

Léčila jsem 35letou pacientku, která ke mně přišla pro velice silné migrény nezabírající na běžnou terapii. Migrény se výrazně zhoršily poté, co začala podnikat, 2x v týdnu jí musela být aplikována analgetika intramuskulárně. Po nasazení Chelidonia a zpočátku i Belladonny, se stav poměrně rychle upravil a v podstatě byla bez obtíží. Po půl roce měla v práci velký incident s uklízečkou, poté dostala migrénu, která trvala 3 dny a nezabrala ani na opakované podání intramuskulárních analgetik a ani na Chelidonium, které si už sama brala. Změnila jsem léčbu – dostala 1 dávku léku Staphysagria a vyšší ředění léku Chelidonium. Migréna do 2 hodin odezněla. Od té doby má klid.

MUDr. Kateřina Formánková, Ostrava

ABECEDA KLINICKÉ HOMEOPATIE

2. kasuistika

Chlapec L. B., nar. 7. 6. 2005

Přichází na jaře 2010 s několik týdnů trvajícím, jak prohlásil dermatolog, "podivným ekzémem" v oblasti vnitřní strany stehen a dále na vnitřní straně holení.

Ekzém byl suchý, olupující se, jen mírně svědivý, více vyjádřen na pravé straně. Spíše vadil matce, než dítěti. Kortikoidní masti od kožního lékaře maminka odmítla, proto dostal jen indiferentní mast, která sice pokožku promastila, ale ekzém se torpidně držel.

Zajímavá byla lokalizace ekzému, která nebyla pro atopický ekzém typická, ale nápadně kopírovala dráhu jater podle čínské medicíny.

Když si dítě svléklo boty, bylo navíc patrné i olupování kůže v oblasti břicha palce pravé DK, tedy tam, kde akupunkturální dráha jater začíná.

Anamnesticky jsem z dokumentace zjistila, že dítě v říjnu loňského roku prodělalo infekční mononukleózu. Jaterní testy se po tehdy podaném léku Phosphorus 9 CH rychle znormalizovaly, v prosinci provedené kontrolní náběry svědčily o stavu po prodělané infekční mononukleóze, dítě bylo bez potíží. Pak ale bohužel přišly Vánoce a s nimi spojené větší množství často tučných a čokoládových dobrot. A právě do této doby matka dávala prvotní výskyt ekzému na DK.

Z mého pohledu jsem potřebovala lék, který by dobře drenoval játra. Chlapec dostal Chelidonium 9 CH 2x denně 5 granulí, byla nasazena dietnější strava s ohledem na játra.

Po měsíci při kontrole ekzém zcela vymizel.

MUDr. Pavla Koželuhová, Plzeň

3. kasuistika

Dívka r. 1998, trpící nechutenstvím, ekzémem a opakovanými katary. Otec alergik, astmatik; matka měla od puberty potíže se žlučníkem a rok po porodu podstoupila CHCE.

První návštěva v naší ordinaci byla v r. 2000 pro zhoršování projevů na kůži po každé ATB terapii a zvláště po potlačení kašle. V období klidu mívá suchou kůži v obličejí a na ramenou, zarudlá svědivá ložiska v loketních jamkách, při zhoršení se objevují šupiny ve vlasech, kůže v loketních jamkách více zrudne, někdy až mokvá, objeví se i ložiska v podkolení a na trupu, více vpravo.

Těhotenství a porod byl bez komplikací, ale měla silnou novorozeneckou žloutenku. Snaha o kojení 3 měsíce, ale už od počátku potřebovala příkrmy. Až do 8. měsíce intenzivně ublinkávala.

Ve 3. týdnu života hospitalizována pro celkové neprospívání a úbytky na váze, neprokázána žádná závažná patologie. Doporučena hypoalergenní mléka. Ve 2 letech znovu kompletně alergologicky vyšetřena, prokázána alergie na kravské mléko a vaječný bílek, upraven jídelníček, nasazen Zaditen kapky. Přes tato opatření moc neprospívá, objevují se časté bolesti břicha a jí jen velmi malé porce jídla.

Při první homeopatické konzultaci předepsáno LYCOPODIUM 30 CH 2x týdně 5 granulí a ARSENICUM IODATUM 15 CH 5x týdně 5 granulí.

Již po několika dávkách začala lépe jíst, ustoupilo všeobecné svědění, po 3 měsících vysadili Zaditen, po kterém byla, dle matky, hodně spavá. Začala chodit i na bazén /chlór/, pak výraznější svědění kůže, které bylo zlepšeno Poumon histamine 15 CH. Celkově se zmenšila nemocnost. Z ramen a obličej se ekzém přesunul více na břicho.

Za nějaký čas matka zpozorovala, že dochází ke zhoršení ekzému, sní-li žloutek, přestože testy na alergologii byly na žloutek negativní. I ve fázích výrazného zlepšení kůže zůstává suchý červený flíček nad pravou lopatkou. Tyto okolnosti vedly k předepsání léku CHELIDONIUM MAJUS 15 CH, který užívala v kombinaci s lékem LYCOPODIUM s přestávkami asi rok. Začala celkově lépe prospívat, vymizely suché dráždivé kašle, které se objevovaly záhy po každém nachlazení nebo jakékoliv indispozici. Během roku se kůže zcela vyčistila. Několik let jsem ji pak neviděla.

Drobné katary jsme řešili s matkou a obvodní dětskou lékařkou, většinou velmi dobře zabíraly na CHELIDONIUM (pokud byl v obraze suchý kašel) nebo na HYDRASTIS (pokud převládala mukopurulentní katar). Několikrát bylo potřeba zopakovat LYCOPODIUM. Asi v šesti letech začala jíst bez problémů i vejce.

Do ordinace přišla znovu v srpnu 2008. Od dubna 2009 má menses s intervaly asi 6 týdnů, se sklony k mdlobám, bolestem hlavy a s psychickými výkyvy – výbuchy pláče střídá popudlivost až záchvaty zlosti. V takových situacích se zamyká ve svém pokoji, pláče nebo zuří, nechce s nikým mluvit. Objevila se i vyrážka na břicho, kterou už několik let neměla. Začala ji vadit vajíčka, buď ji po nich bolí břicho, nebo hlava. Předepsána SEPIA 30 CH 2x týdně 5 granulí a CHELIDONIUM 15 CH 5x týdně 5 granulí po dobu 3 měsíců. Zkrátily se intervaly mezi menstruacemi, zlepšila se psychika, vyčistila se kůže. A zase může jíst bez problémů i vejce.

Má zkušenost je taková, že pacienty s alergiemi v raném dětství je prospěšné dlouhodobě sledovat, naučit je řešit běžné banální potíže pomocí homeopatických léků a nebát se předepsat jiný lék, když se změní celkové příznaky.

MUDr. Hana Váňová, Litovel